



FICHA TÉCNICA



BIOESTIMULANTE PARA AMARRE DE FLOR

Complejo hormonal adicionado con un balance de macro y micronutrientes que favorecen el amarre de flor además del incremento en el tamaño de los frutos.

Contenido química	% p/v
Nitrógeno (N)	0.17
Fósforo (P ₂ O ₅)	0.75
Azufre (S)	0.92
Magnesio (MgO)	0.51
Zinc (Zn)	1.52
Molibdeno (Mo)	2.31

Fertilizante para uso al suelo y foliar enriquecido con Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Magnesio, Zinc, Molibdeno y Auxinas, Giberelinas y Ácido Salicílico. Recomendado para ser usado en cultivos que requieran de estos elementos, los cuales en forma líquida son más rápidamente asimilables por las hojas y las raíces, siendo utilizados en las funciones de crecimiento, desarrollo y producción de la planta. Cuando se aplica el producto se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar las altas temperaturas mayores a 35 °C.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:

- Incrementa el número de brotes florales amarrados.
- Evita pérdidas por aborto de frutos en las primeras etapas.
- Rompe dominancia apical.
- Incrementa el número celular por fruto lo que se traduce en la posibilidad un mayor tamaño.
- Incrementa el número de brotes de mayor calibre.
- Uniformiza los tamaños de los frutos a cosecha.

FORMA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **CHRISANTO** vía aspersión foliar asegurando que la aplicación tenga una cobertura uniforme.

Desintoxicando el planeta



Destape con cuidado el envase, mida en probeta graduada la cantidad indicada de **CHRISANTO** a aplicar, se recomienda el uso de 200 a 400 L/ha (140 a 280 L/mz) de volumen de aspersión en aplicación terrestre o 60 a 100 L/ha (42 a 70 L/mz) en aplicación aérea, para que asegure una aplicación uniforme.



APLICACIÓN
AL SUELO



APLICACIÓN
FOLIAR

DOSIS Y USOS AUTORIZADOS

CULTIVOS	RECOMENDACIONES
Ejote francés, arveja, frijol, haba, maní, soya, zanahoria, apio, perejil, cilantro, ajo, berenjena, brócoli, repollo, coliflor, col de bruselas, espárrago, lechuga, melón, pepino, sandía, calabaza, cebolla, papa, rábano, tomate, chile, maíz, maíz dulce, fresa, arándano, frambuesa, mora, café, durazno, melocotón, manzana, ciruela, plátano, banano, palma africana, macadamia, aguacate, limón, piña, mango, papaya, cardamomo, flores, follajes, caña de azúcar, stevia, sávila, pilones y almácigos de cultivos, jardinería doméstica.	Se recomienda una aplicación a inicio de floración de 0.5 L/ha (0.35 L/mz) para la estimulación y amarre de flor. Realizar aplicaciones de 0.5 a 1 L/ha (0.35 a 0.7 L/mz) cuando el fruto alcance del 20% al 30% de su tamaño y repetir cada 15 días, de 2 a 3 aplicaciones. En ornamentales, se recomienda aplicar 0.4 a 0.8 L/ha (0.28 a 0.56 L/mz) a inicio de formación de botón y repetir cada 15 días, de 2 a 3 aplicaciones En el caso de Frutales se recomienda de 1 a 1.5 L/ha (0.7 a 1.05 L/mz) al inicio de floración botón y repetir cada 15 días, de 2 a 3 aplicaciones

INCOMPATIBILIDAD: Evite mezclar con fungicidas o soluciones de fertilizantes que puedan cambiar el pH o conductividad eléctrica en exceso, así como con productos de fuerte reacción alcalina o bien usar equipos que presenten residuos de estos.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad, recomendamos siempre consultar a los especialistas de Agroindustrias Successo”

Desintoxicando el planeta

Agroindustrias Successo S.A. 8ª calle 13-78, Manzana C, Lote 25, zona 8, Colonia Granjas de San Cristóbal A-10, Mixco, Guatemala, Guatemala C.A. PBX: + (502) 22995800. @: info@successo.bio.
www.successo.bio

