



FICHA TÉCNICA



NUTRICIÓN
Fertilizante foliar

Fertilizante de alta asimilación a base de calcio, boro, oligosacarinas y ácidos polihidroxicarboxílicos que ayuda al incremento de la floración y amarre de fruto.

Contenido mínimo garantizado	% m/v
Oxido de Calcio (CaO)	14.20
Boro (B)	0.32

STALO^{Ca-B} es un fertilizante líquido de elementos secundarios que promueven la división celular y altamente recomendados para estimular el crecimiento de las plantas.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:

- Correcta formación del fruto.
- Previene y corrige deficiencias de calcio y boro.
- Rápida asimilación en la planta.
- Incrementa la floración y el amarre del fruto.
- Es ambientalmente seguro.

FORMA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **STALO^{Ca-B}** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje de la planta.

Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de **STALO^{Ca-B}** y realice en un recipiente con agua una premezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

No aplicar con altas temperaturas ni cuando exista alta velocidad del viento.



APLICACIÓN
FOLIAR

Desintoxicando el planeta



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis	Frecuencia de aplicación
Tomate, Chile dulce, Zanahoria, Brócoli, Arveja china, Arveja dulce, Lechuga, Ejote francés, Cebolla, Pepino, Melón, Sandía, Espárrago, Okra, Soya, Rábano, Remolacha, Maní, Papa, Maíz, Frijol.	1.0 a 2.0 L/ha (0.7 a 1.4 L/Mz)	Cada 15 días con un máximo de 3 aplicaciones a partir de la etapa de floración
Naranja, Rambután, Macadamia, Mango, Papaya, Café, Aguacate, Limón, Lima, Mangostán, Chicozapote, Pitahaya, Cacao, Plátano, Guayaba, Pimienta negra.	1.0 a 2.0 L/ha (0.7 a 1.4 L/Mz)	Cada 15 días con un máximo de 3 aplicaciones a partir de la etapa de floración
Palma africana, Banano, Plátano, Piña, Maíz.	1.0 a 2.0 L/ha (0.7 a 1.4 L/Mz)	Cada 15 días con un máximo de 3 aplicaciones a partir de la etapa de floración
Rosas, Clavel, Hoja de cuero, Girasol, Crisantemo, Gerbera, Gladiola, Lisanthus, Zinnia.	1.0 a 2.0 L/ha (0.7 a 1.4 L/Mz)	Cada 15 días con un máximo de 3 aplicaciones a partir de la etapa de floración

INCOMPATIBILIDAD: Realizar pruebas de compatibilidad con agroquímicos de uso común, antes de la mezcla.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad, recomendamos siempre consultar a los especialistas de Agroindustrias Successo”

Desintoxicando el planeta

Agroindustrias Successo S.A. 8ª calle 13-78, Manzana C, Lote 25, zona 8, Colonia Granjas de San Cristóbal A-10, Mixco, Guatemala, Guatemala C.A. PBX: + (502) 22995800. @: info@successo.bio.
www.successo.bio

